

Просталін форте

**ЗАПИТУЙТЕ В
АПТЕКАХ МІСТА**



Перед вживанням порадьтесь з лікарем.

Ефективний допоміжний засіб при лікуванні простатитів

Допоможе зняти запалення передміхурової залози
та нормалізувати сечевипускання.

1 СУПОЗИТОРІЙ МІСТИТЬ:

- ✓ іхтамолу 0,15 г,
- ✓ калію йодиду 0,1 г,
- ✓ екстракту гамамелісу (Hamamelis) 0,1 г



WWW.FACEBOOK.COM/PROSTALIN

ТЕЛ.: (044) 223 23 13

Просталін форте

Профілактично-гігієнічний засіб

Для використання при гіпертрофії та запаленні передміхурової залози.

Склад:

Іхтаммолу – 0,15 г,

Калія йодиду – 0,10 г,

Екстракту гамамелісу – 0,10г

Гамамеліс

(Hamamelis virginiana)

Дикоростучий чагарник, що зустрічається на Атлантичному узбережжі Північної Америки, на Чорноморському узбережжі Кавказу та у Східній Азії. Листя, квіти та кору гамамелісу у продовж віків вважали лікувальними засобами.

Активні речовини рослини - гамамелітанін, ефірні масла та флавоноїди мають проти-запальну, кровозупиняючу, судозвужуючу та антибактеріальну дію.

Гамамеліс є одним з найкращих засобів при варикозному розширенні вен, при тромбофлебитах та кровоточачому геморої. Також він має потужну в'яжучу властивість, що сприяє усуненню запалень і спазмів, зменшенню набряку.

Іхтаммол

Іхтаммол — аммонієва сіль — продукт сухої перегонки бітумінозних сланців.

Має антимікробний вплив стосовно грибів, дріжджів та бактерій (стафілококків і стрептококків), та проявляє локально-анестезуючі властивості.

Іхтаммол також регулює судинний тонус, відновлює кровообіг, покращує обмін речовин.

Застосовується при захворюваннях шкіри та органів малого тазу (простатит, метрит,

параметрит, сальпінгіт та інші запальні захворювання).

Калія йодид

Калія йодид - калієва сіль йодоводородної кислоти.

Калія йодид сприяє розсмоктуванню інфільтратів, справляє протизапальний та протигрибковий вплив.

Сукупна дія компонентів препарату

- *антисептична,*
- *протизапальна,*
- *в'яжуча,*
- *спазмолітична,*
- *зменшує подразнення,*
- *знімає набряк передміхурової залози.*

Рекомендується для комплексного лікування хронічних неспецифічних простатитів, що супроводжуються розладами сечовипускання, хронічних простатитів на фоні гіперплазії передміхурової залози, а також при функціональних розладах сечовипускання (дізурії, ніктурії, поллакіурії).

Зменшує запальну реакцію та набряк в тканині передміхурової залози, сприяє посиленню її секреторної активності, має антипроліферативний вплив на фібробласти*

Бойко М.І. Застосування препарату Просталін у пацієнтів з хронічним простатитом // ЗДОРОВ'Я МУЖЧИН. – 2003. - №4. – С.48-50

Інформація для використання у професійній діяльності медичними та фармацевтичними працівниками.